

LIPOSOLUZIONE ALIMENTARE (LSA) terapia riabilitativa nutrizionale

La LIPOSOLUZIONE ALIMENTARE è una metodica di nutrizione enterale (per sondino naso-gastrico) a base di integratori alimentari (aminoacidi, proteine e fibre) che, producendo corpi chetogeni (con sintomatico effetto di sazietà), in un'accoppiata vincente di catabolismo e anabolismo insieme, brucia esclusivamente massa grassa, mentre contemporaneamente disintossica e nutre il cervello e i muscoli.

A termine di una sperimentazione scientifica condotta a cavallo tra fine 2008 e i primi mesi del 2010 su oltre 300 persone obesi e in sovrappeso con patologie croniche della sindrome metabolica, i risultati del 100% dei casi trattati con la LipoSoluzione Alimentare, in assenza di alcun farmaco, sono tali (la perdita in media del 10% del peso corporeo in un solo ciclo di 10 giorni) per cui è possibile affermare che la metodica della LSA può apportare un colpo decisivo contro la crescita esponenziale e sempre più globalizzata della percentuale di obesità: 5milioni solo in Italia, senza contare tutte le delicate problematiche generazionali connesse ai disturbi alimentari dell'infanzia e dell'adolescenza, quali l'anoressia e la bulimia. La terapia risulta come una riabilitazione vincente, oltre che sul problema fisico, anche come eccellente sostegno psicologico per affrontare la patologia nella sua cronicità. A fine trattamento si sono evidenziati dei benefici significativi sulle più diffuse patologie croniche correlate alla sindrome metabolica, quali: il diabete, le cardiopatie, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, le epatopatie, le ipopnee e apnee notturne, il dolore articolare.

RISULTATI

I risultati sono molto interessanti in quanto tutti i pazienti (100%) hanno ottenuto una riduzione del peso corporeo, rispettivamente: nel primo trattamento dal 9% al 13%, e nel secondo trattamento dal 7% al 10%; nei periodi di dieta proteica un ulteriore 2%, per una media complessiva pari al 18% di perdita di peso. Il parametro in assoluto più interessante è che la percentuale di grasso corporeo eliminato (total body) è in media superiore al 65%. Alla fine di ogni trattamento, la riduzione della circonferenza è pari a: 4,5+ - 0,5 cm; mentre la riduzione degli spessori ecografici è di: 2+ - 0,48 cm.

I dati MICROS dimostrano che in tutti i pazienti, la terapia determina un notevole miglioramento del peso corporeo in breve tempo e anche sul mantenimento, e netti miglioramenti del quadro ematologico in tutti quei pazienti i cui valori erano oltre i limiti. Gli effetti collaterali sono pari a zero non avendo riscontrato, sia nel primo trattamento, sia nel secondo, valori o problematiche organiche, ma solo sintomatologie di poco conto. Nei rispettivi controlli a seguire, a un mese e successivamente a due - quattro - otto mesi, i parametri migliorati sono rimasti invariati, e nel 75% dei pazienti si è riscontrato un'ulteriore riduzione del peso, in media del 4-7%.